

destete de los borregos dorper

Escrito por sagarpa: Google Noticias
Domingo, 19 de Junio de 2016 12:32

El destete de los borregos Dorper generalmente se lleva a cabo entre las 8 y las 12 semanas de edad, dependiendo de la situación individual de cada cría. Sin embargo, la mayoría de los criadores suelen destetar a los corderos cuando tienen entre 8 y 10 semanas.

Es importante destetar a los corderos en un momento adecuado para asegurar su transición exitosa a una dieta de pasto o alimento balanceado. Al destetarlos demasiado temprano, pueden no recibir la nutrición adecuada para un crecimiento saludable. Por otro lado, al destetarlos demasiado tarde, pueden ser demasiado dependientes de la leche materna y tener dificultades para adaptarse a una dieta distinta.

Además, el destete también es importante para la hembra, ya que le permite recuperarse y estar lista para la próxima camada. Por lo tanto, es importante monitorear a la hembra y a los corderos durante el proceso de destete para asegurarse de que estén saludables y recibiendo la nutrición adecuada.

Una vez destetados, los borregos Dorper deben ser alimentados con una dieta balanceada que incluya alimento para corderos o pasto de buena calidad.

Aquí hay algunos consejos para alimentar a los corderos Dorper:

Alimento para corderos: Este tipo de alimento está diseñado específicamente para cubrir las necesidades nutricionales de los corderos y es una buena opción para aquellos que no tienen acceso a pasto de calidad.

Pasto: Si los corderos tienen acceso a pasto de buena calidad, deben ser alimentados con este tipo de alimento, ya que es una fuente natural de nutrición.

Proteínas: Los corderos Dorper también pueden requerir una fuente adicional de proteínas, como granos o concentrados, para apoyar su crecimiento y desarrollo.

Vitamínicos y minerales: Además de una dieta equilibrada, es importante proporcionar a los corderos un suplemento vitamínico y mineral para asegurarse de que estén recibiendo la nutrición adecuada.